

Envidor® 240 SC



CUIDADO

(SECTOR IZQUIERDO)

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Spirodiclofen pertenece al Grupo Químico de los derivados de los ácidos tetrónicos y tetrámicos.

Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos, y ropa. Puede causar sensibilización en contacto con la piel. Durante la manipulación del producto utilice guantes impermeables (preferentemente de nitrilo), botas de goma, delantal y pantalla facial. Durante su aplicación utilice traje impermeable completo, guantes (preferentemente de nitrilo), botas de goma y pantalla facial. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Precauciones para el medio ambiente: No contaminar semillas, alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. El producto es tóxico a peces. No tóxico a abejas, sin embargo, se recomienda no aplicar en floración para no afectar las colmenas.

Almacenamiento: Transportar, comercializar y almacenar este producto sólo en sus envases originales, bien cerrados y provistos de su etiqueta. Conservar en lugar seguro, fresco, seco, bien ventilado, bajo llave en lugar exclusivo para productos fitosanitarios. Evitar temperaturas menores a -10°C y mayores a 40°C .

Instrucciones para realizar triple lavado de envases: Vacíe el envase en el estanque pulverizador y manténgalo en posición de descarga 30 segundos; a continuación agregue agua hasta un cuarto (1/4) de la capacidad del envase. Luego cierre el envase y agite durante 30 segundos; vierta el agua en el equipo pulverizador y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar este procedimiento tres veces. Finalmente, perforo el envase para evitar su reutilización.

Síntomas de intoxicación: No presenta sintomatología específica por intoxicación.

Primeros auxilios: Información general: retirar al afectado de la zona de peligro. Procure atención médica inmediata. Si existe riesgo de inconsciencia, colocar y transportar en posición lateral estable. Retirar las ropas sucias o contaminadas inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lavarla inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos profusamente con agua limpia y fluyendo. Consultar a un oftalmólogo. En caso de ingestión, llamar a un médico inmediatamente. En caso de inhalación trasladar al afectado al aire fresco.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Asistencia básica, descontaminación y tratamiento sintomático.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

Teléfonos de emergencia:

(2) 635 38 00 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. (Atención las 24 horas) Convenio CITUC/AFIPA.

(2) 661 94 14 - 777 19 94 Red de Información Toxicológica y Alerta RITA. (Atención las 24 horas)

(2) 520 82 00 Bayer S.A. (Atención en horario de oficina)

Nota al comprador: A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente, todos los riesgos de su uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los países de destino.

(SECTOR CENTRAL)

Envidor[®] 240 SC
ACARICIDA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Envidor[®] 240 SC actúa por contacto sobre todos los estados de desarrollo de ácaros, incluyendo huevos; se recomienda su uso en frutales de carozo, pomáceas, paltos, vides, kiwis y cítricos según las indicaciones detalladas en la sección instrucciones de uso.

Composición.

Ingrediente activo

Spirodiclofen (*)..... 24 % p/v (240 g/L)

Ingredientes inertes c.s.p. completar.....1 Litro

(*) 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate (IUPAC).

®: Marca Registrada de Bayer CropScience AG

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES
DE USAR EL PRODUCTO”

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1713

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.

C. Fernández 260 Casilla 471-3 Stgo. 3

(Logo Bayer CropScience)

Fabricado por:

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel Str. 50

D-40789

Monheim, Alemania

Bayer S.A.S.

16, rue Jean-Marie Leclair, CP 90106, 69266

Lyon Cedex 09,

Francia

Contenido neto: L

(SECTOR DERECHO)

Instrucciones de uso:

Envidor[®] 240 SC actúa por contacto sobre todos los estados de desarrollo de ácaros, incluyendo huevos. Es efectivo tanto en aplicaciones tempranas o preventivas como también durante toda la temporada con presencia de poblaciones mayores de la plaga. Sin embargo para obtener resultados óptimos, de modo de aprovechar todas las ventajas de **Envidor[®] 240 SC**, debe ser aplicado como tratamiento preventivo al inicio de las infestaciones de arañas o tarde en la estación, siempre y en lo posible al inicio de los umbrales críticos poblacionales.

Los primeros individuos comienzan a ser controlados 2 a 3 días post-aplicación. Presenta largo efecto residual y notables efectos de protección.

Su ingrediente activo Spirodiclofen, presenta un nuevo modo de acción, inhibiendo la síntesis de lípidos. Por esto el producto no presenta resistencia cruzada con otros acaricidas actualmente utilizados.

Envidor[®] 240 SC, no tiene un impacto negativo sobre las poblaciones de insectos predadores de arañas (*Phytoseidos*). Esta característica hace de **Envidor[®] 240 SC** una excelente alternativa para su uso en Programas de Manejo Integrado de Plagas. En vides y huertos frutales que presenten su área foliar ya estabilizada, se obtendrá un efecto de protección más amplio.

Cultivo	Plaga	Concentración (cc/100 L de agua)	Observaciones
Vides de mesa, para vino y para pisco.	Falsa araña roja de la vid, Araña roja de la vid.	50 - 60	Aplicar Envidor[®] 240 SC a inicios de las infestaciones de arañas, temprano o tarde en la temporada, antes que las poblaciones de ácaros sobrepasen los umbrales de daño económico, especialmente si se observa una baja relación de insecto benéfico/plaga. En aplicaciones en vides conducidas en sistema espaldera, considerar un volumen de aplicación entre 500 y 1000 L de agua/ha. En general para parronales utilizar entre 1200 – 2000 L de agua/ha. Volúmenes de agua a utilizar, en L/ha: frutales de carozo y pomáceas entre 1500 y 2500; nogales, entre 1500 y 3000; cítricos y paltos, entre 2000 y 4000 y kiwis considerar entre 1500 y 2000.
Manzanos, Perales, Durazneros, Nectarinos, Ciruelos, Cerezos, Nogales, Almendros, Damascos, Naranjos, Clementinos, Limoneros,	Araña roja europea, Araña bimaclada, Araña roja del palto, Araña roja de los cítricos, Falsa araña roja de la vid, Araña parda de los frutales.	50 - 60	En casos particulares de huertos que presenten una mayor canopia, aumentar los volúmenes de agua a aplicar hasta punto de goteo, manteniendo la concentración. Por tratarse de un producto de contacto, para lograr un óptimo control se requiere de completa cobertura de las partes infestadas. Privilegiar siempre un buen cubrimiento de la canopia a tratar.

Paltos, Kiwis.			
-------------------	--	--	--

Seguendo las directivas del IRAC, se recomienda realizar sólo una aplicación por temporada. En caso que otro tratamiento sea requerido, un acaricida de otro grupo químico con distinto modo de acción debería utilizarse.

Período de carencia para Chile: Manzanos, perales, durazneros, nectarinos, ciruelos, cerezos, almendros, damascos, naranjos, clementinas, limoneros, paltos y kiwis: 14 días. Nogales: 7 días. Vides de mesa, vides para vino y vides para pisco: 1 día.

Bajo ciertas condiciones naturales, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o diferente sensibilidad a acaricidas, por lo tanto esto puede ocurrir a **Envidor® 240 SC** como a otros productos de su mismo grupo químico, a través de una variación genética normal en cualquier población de ácaros. Estos ejemplares resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de acaricidas y la población llegará a ser de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **Envidor® 240 SC**, por lo que Bayer no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de dudas, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza. Spirodiclofen, de acuerdo a la clasificación IRAC, pertenece al Grupo 23, Inhibidores de ácidos tetrónicos y tetrámicos.

Preparación de la mezcla: Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. Incorpore a través del filtro la cantidad necesaria de **Envidor® 240 SC** de acuerdo a la dosis. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

Compatibilidades: Compatible con varios de los productos fitosanitarios de uso común. Al realizar una mezcla no conocida se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad. Ante la duda sobre mezclas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Incompatibilidades: Incompatible con productos fitosanitarios de reacción alcalina o fuertemente oxidantes. Ante la duda sobre mezclas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y siguiendo buenas prácticas agrícolas.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar hasta transcurridas 2 horas después de la aplicación, verificando que la aspersion se haya secado sobre la superficie tratada. Para animales, no corresponde indicar un tiempo de reingreso ya que los cultivos indicados no se destinan a uso animal en pastoreo.